

Roaccutane® no debe tomarse durante el embarazo.

Roaccutane® puede dañar seriamente al feto si una mujer embarazada lo toma.

Si queda embarazada o cree que podría estar embarazada, deje de tomar Roaccutane® inmediatamente y comuníquese con su médico

Lea atentamente el prospecto antes de comenzar el tratamiento.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de tomar Roaccutane®, hable con su médico o farmacéutico.

Qué debe hacer si puede quedar embarazada:

- ❗ **Debe usar al menos 1 método anticonceptivo altamente eficaz (como un dispositivo intrauterino o un implante) o usar correctamente 2 métodos efectivos de anticoncepción que funcionan de diferentes maneras (tales como un anticonceptivo oral junto con un condón) antes, durante y por 1 mes después de suspender el tratamiento.**

❗ **Usted no debe quedar embarazada mientras toma Roaccutane®, o durante 1 mes después de suspender el tratamiento.**

- ❗ **Debe asistir a visitas de seguimiento regulares y hacerse pruebas de embarazo regularmente:**
 - Antes de comenzar el tratamiento, deberá realizarse una prueba de embarazo, que debe ser negativa.
 - Para asegurarse de que no esté embarazada durante el tratamiento, debe realizarse pruebas de embarazo con regularidad, idealmente todos los meses. También debe hacerse una prueba de embarazo final 1 mes después de suspender el tratamiento

Recordatorio para hombres y mujeres

Este medicamento se le ha recetado a usted, **no lo comparta con nadie y devuelva las cápsulas que no utilizó a la farmacia.**

Tarjeta de recordatorio para el paciente

Nombre del médico:

Teléfono:

Notas: